

پروتکل نحوه ارسال نمونه آمنیون

نحوه تهیه نمونه آمنیون

ترجیحاً ۲ سرنگ هر کدام ۱۰ سی سی گرفته شود. مقادیر کمتر از ۱۰ سی سی ممکن است به نتیجه نرسند. ترجیحاً نمونه برداری در سرنگ های یکسان انجام شود. جهت جلوگیری از آلودگی نمونه با سلول های مادری چند قطره آمنیون تهیه شده اولیه خالی گردد.

نکته: احتمال آلودگی با سلول های مادری و یا عدم رشد در نمونه های کدر و خونی افزایش می یابد. لطفاً از هر گونه دستکاری سرنگ ها (خم کردن یا برداشتن سوزن، برداشتن کلاهک، شکستن پیستون و...) خودداری فرمائید.

شرایط نمونه برداری

بهترین زمان جهت انجام آزمایش کشت و مطالعه کروموزومی روی مایع آمنیوتیک بین ۱۵ الی ۱۸ هفته بارداری می باشد و امکان عدم رشد در نمونه های بالای ۲۰ هفته بارداری افزایش می یابد.

نکته: زودتر از ۱۵ هفته بارداری نمونه برداری انجام نشود.

مشخصات الزامی

نام، نام خانوادگی، تاریخ تولد مادر، هفته بارداری و در صورت وجود، شماره پذیرش در مرکز کریمی نژاد-نجم آبادی روی سرنگ یا لوله فالكون ثبت گردد.

مدارک مورد نیاز

مدارک لازم برای انجام آزمایش آخرین سونوگرافی، تست های غربالگری، آزمایشات قبل از بارداری، خلاصه پرونده پزشکی و نسخه پزشک می باشد.

شرایط پیشنهادی نگهداری دمائی و زمانی تا لحظه تحویل به مرکز

حداکثر ۲۴ ساعت دمائی یخچال

سرنگ ها یا لوله های فالكون را داخل فلاسک قرار دهید.

در فصل گرما Ice pack (بسته های یخ) را در داخل فلاسک قرار داده به طوری که یونولیت بین سرنگ ها و بسته یخ خشک قرار گیرد. به هیچ عنوان نمونه های

مایع آمنیوتیک در مجاورت مستقیم با یخ نباشند. در فصل سرما احتیاجی به استفاده از Ice pack (بسته های یخ) نمی باشد.

بازه زمانی تحویل

ساعت تحویل نمونه ها در روزهای کاری از شنبه تا چهارشنبه ۷:۳۰ الی ۱۷ و پنجشنبه ها ۷:۳۰ الی ۱۳:۳۰ ظهر می باشد.